



Při přecitlivělosti na benzokain bývá také kontaktní alergie na lokální anestetika prokain a tetrakain. Protože patří mezi paraaminoloučeniny (deriváty kyseliny 4-aminobenzoové), je možná skupinová přecitlivělost na parafenylendiamin (používaný v barvách na vlasy a kožešiny), sulfonamidy, deriváty PABA, toluendiamin a azo- nebo anilinové barvy. Mezi další látky, které mohou vyvolat pozitivní reakci při testování s benzokainem patří i některé léky např.: prokainamid, butethamid, hydrochlorothiazid a další.

Výrobce: CHEMOTECNIQUE DIAGNISTICS, AB

Při přecitlivělosti na benzokain bývá také kontaktní alergie na lokální anestetika prokain a tetrakain. Protože patří mezi paraaminoloučeniny (deriváty kyseliny 4-aminobenzoové), je možná skupinová přecitlivělost na parafenylendiamin (používaný v barvách na vlasy a kožešiny), sulfonamidy, deriváty PABA, toluendiamin a azo- nebo anilinové barvy. Mezi další látky, které mohou vyvolat pozitivní reakci při testování s benzokainem patří i některé léky např.: prokainamid, butethamid, hydrochlorothiazid a další.

Výrobce: CHEMOTECNIQUE DIAGNISTICS, AB

Při přecitlivělosti na benzokain bývá také kontaktní alergie na lokální anestetika prokain a tetrakain. Protože patří mezi paraaminoloučeniny (deriváty kyseliny 4-aminobenzoové), je možná skupinová přecitlivělost na parafenylendiamin (používaný v barvách na vlasy a kožešiny), sulfonamidy, deriváty PABA, toluendiamin a azo- nebo anilinové barvy. Mezi další látky, které mohou vyvolat pozitivní reakci při testování s benzokainem patří i některé léky např.: prokainamid, butethamid, hydrochlorothiazid a další.

Výrobce: CHEMOTECNIQUE DIAGNISTICS, AB

Při přecitlivělosti na benzokain bývá také kontaktní alergie na lokální anestetika prokain a tetrakain. Protože patří mezi paraaminoloučeniny (deriváty kyseliny 4-aminobenzoové), je možná skupinová přecitlivělost na parafenylendiamin (používaný v barvách na vlasy a kožešiny), sulfonamidy, deriváty PABA, toluendiamin a azo- nebo anilinové barvy. Mezi další látky, které mohou vyvolat pozitivní reakci při testování s benzokainem patří i některé léky např.: prokainamid, butethamid, hydrochlorothiazid a další.

Výrobce: CHEMOTECNIQUE DIAGNISTICS, AB

Při přecitlivělosti na benzokain bývá také kontaktní alergie na lokální anestetika prokain a tetrakain. Protože patří mezi paraaminoloučeniny (deriváty kyseliny 4-aminobenzoové), je možná skupinová přecitlivělost na parafenylendiamin (používaný v barvách na vlasy a kožešiny), sulfonamidy, deriváty PABA, toluendiamin a azo- nebo anilinové barvy. Mezi další látky, které mohou vyvolat pozitivní reakci při testování s benzokainem patří i některé léky např.: prokainamid, butethamid, hydrochlorothiazid a další.

Výrobce: CHEMOTECNIQUE DIAGNISTICS, AB

Při přecitlivělosti na benzokain bývá také kontaktní alergie na lokální anestetika prokain a tetrakain. Protože patří mezi paraaminoloučeniny (deriváty kyseliny 4-aminobenzoové), je možná skupinová přecitlivělost na parafenylendiamin (používaný v barvách na vlasy a kožešiny), sulfonamidy, deriváty PABA, toluendiamin a azo- nebo anilinové barvy. Mezi další látky, které mohou vyvolat pozitivní reakci při testování s benzokainem patří i některé léky např.: prokainamid, butethamid, hydrochlorothiazid a další.

Výrobce: CHEMOTECNIQUE DIAGNISTICS, AB

Při přecitlivělosti na benzokain bývá také kontaktní alergie na lokální anestetika prokain a tetrakain. Protože patří mezi paraaminoloučeniny (deriváty kyseliny 4-aminobenzoové), je možná skupinová přecitlivělost na parafenylendiamin (používaný v barvách na vlasy a kožešiny), sulfonamidy, deriváty PABA, toluendiamin a azo- nebo anilinové barvy. Mezi další látky, které mohou vyvolat pozitivní reakci při testování s benzokainem patří i některé léky např.: prokainamid, butethamid, hydrochlorothiazid a další.

Výrobce: CHEMOTECNIQUE DIAGNISTICS, AB

Při přecitlivělosti na benzokain bývá také kontaktní alergie na lokální anestetika prokain a tetrakain. Protože patří mezi paraaminoloučeniny (deriváty kyseliny 4-aminobenzoové), je možná skupinová přecitlivělost na parafenylendiamin (používaný v barvách na vlasy a kožešiny), sulfonamidy, deriváty PABA, toluendiamin a azo- nebo anilinové barvy. Mezi další látky, které mohou vyvolat pozitivní reakci při testování s benzokainem patří i některé léky např.: prokainamid, butethamid, hydrochlorothiazid a další.

Výrobce: CHEMOTECNIQUE DIAGNISTICS, AB