SÍRAN NIKELNATÝ

Synonyma a jiné názvy:
Nikl sulfát, Nickel sulfate, Niccolum sulfuricum, Niccoli sulfas

Přecitlivělost na nikl je nejčastější příčinou vzniku alergické kontaktní dermatitidy (ACD) na celém světě. Ionty niklu jsou dnes kvůli zušlechťování kovů, defacto ve všech kovech, včetně kovů vzácných. Nikl se používá k povrchové úpravě mnoha předmětů denního použití. Nikl se využívá v elektroprůmyslu (v galvanovnách, akumulátory, baterie). Soli niklu se používají jako přísady do bělicích činidel (např. prací prostředky), do barev a glazur a při výrobě minerálních olejů, cementu či chemických hnojiv.
Kontaktní dermatitida na nikl se může vyskytovat např. po kontaktu s oděvní bižuterií (cvočky, nýty knoflíky, přívěsky, zdrhovadla, spony, přezky, aj.), s klenoty a bižuteriií (náušnice, řetízky, náramky,

Informace pro pacienta www.epitesty.cz

SÍRAN NIKELNATÝ

Synonyma a jiné názvy:
Nikl sulfát, Nickel sulfate, Niccolum sulfuricum, Niccoli sulfas

Přecitlivělost na nikl je nejčastější příčinou vzniku alergické kontaktní dermatitidy (ACD) na celém světě. Ionty niklu jsou dnes kvůli zušlechťování kovů, defacto ve všech kovech, včetně kovů vzácných. Nikl se používá k povrchové úpravě mnoha předmětů denního použití. Nikl se využívá v elektroprůmyslu (v galvanovnách, akumulátory, baterie). Soli niklu se používají jako přísady do bělicích činidel (např. prací prostředky), do barev a glazur a při výrobě minerálních olejů, cementu či chemických hnojiv.
Kontaktní dermatitida na nikl se může vyskytovat např. po kontaktu s oděvní bižuterií (cvočky, nýty knoflíky, přívěsky, zdrhovadla, spony, přezky, aj.), s klenoty a bižuteriií (náušnice, řetízky, náramky,

Informace pro pacienta www.epitesty.cz

SÍRAN NIKELNATÝ

Synonyma a jiné názvy:
Nikl sulfát, Nickel sulfate, Niccolum sulfuricum, Niccoli sulfas

Přecitlivělost na nikl je nejčastější příčinou vzniku alergické kontaktní dermatitidy (ACD) na celém světě. Ionty niklu jsou dnes kvůli zušlechťování kovů, defacto ve všech kovech, včetně kovů vzácných. Nikl se používá k povrchové úpravě mnoha předmětů denního použití. Nikl se využívá v elektroprůmyslu (v galvanovnách, akumulátory, baterie). Soli niklu se používají jako přísady do bělicích činidel (např. prací prostředky), do barev a glazur a při výrobě minerálních olejů, cementu či chemických hnojiv.
Kontaktní dermatitida na nikl se může vyskytovat např. po kontaktu s oděvní bižuterií (cvočky, nýty knoflíky, přívěsky, zdrhovadla, spony, přezky, aj.), s klenoty a bižuteriií (náušnice, řetízky, náramky,

Informace pro pacienta www.epitesty.cz

SÍRAN NIKELNATÝ

Synonyma a jiné názvy:
Nikl sulfát, Nickel sulfate, Niccolum sulfuricum, Niccoli sulfas

Přecitlivělost na nikl je nejčastější příčinou vzniku alergické kontaktní dermatitidy (ACD) na celém světě. Ionty niklu jsou dnes kvůli zušlechťování kovů, defacto ve všech kovech, včetně kovů vzácných. Nikl se používá k povrchové úpravě mnoha předmětů denního použití. Nikl se využívá v elektroprůmyslu (v galvanovnách, akumulátory, baterie). Soli niklu se používají jako přísady do bělicích činidel (např. prací prostředky), do barev a glazur a při výrobě minerálních olejů, cementu či chemických hnojiv.
Kontaktní dermatitida na nikl se může vyskytovat např. po kontaktu s oděvní bižuterií (cvočky, nýty knoflíky, přívěsky, zdrhovadla, spony, přezky, aj.), s klenoty a bižuteriií (náušnice, řetízky, náramky,

Informace pro pacienta www.epitesty.cz

SÍRAN NIKELNATÝ

Synonyma a jiné názvy:
Nikl sulfát, Nickel sulfate, Niccolum sulfuricum, Niccoli sulfas

Přecitlivělost na nikl je nejčastější příčinou vzniku alergické kontaktní dermatitidy (ACD) na celém světě. Ionty niklu jsou dnes kvůli zušlechťování kovů, defacto ve všech kovech, včetně kovů vzácných. Nikl se používá k povrchové úpravě mnoha předmětů denního použití. Nikl se využívá v elektroprůmyslu (v galvanovnách, akumulátory, baterie). Soli niklu se používají jako přísady do bělicích činidel (např. prací prostředky), do barev a glazur a při výrobě minerálních olejů, cementu či chemických hnojiv.
Kontaktní dermatitida na nikl se může vyskytovat např. po kontaktu s oděvní bižuterií (cvočky, nýty knoflíky, přívěsky, zdrhovadla, spony, přezky, aj.), s klenoty a bižuteriií (náušnice, řetízky, náramky,

Informace pro pacienta www.epitesty.cz

SÍRAN NIKELNATÝ

Synonyma a jiné názvy:
Nikl sulfát, Nickel sulfate, Niccolum sulfuricum, Niccoli sulfas

Přecitlivělost na nikl je nejčastější příčinou vzniku alergické kontaktní dermatitidy (ACD) na celém světě. Ionty niklu jsou dnes kvůli zušlechťování kovů, defacto ve všech kovech, včetně kovů vzácných. Nikl se používá k povrchové úpravě mnoha předmětů denního použití. Nikl se využívá v elektroprůmyslu (v galvanovnách, akumulátory, baterie). Soli niklu se používají jako přísady do bělicích činidel (např. prací prostředky), do barev a glazur a při výrobě minerálních olejů, cementu či chemických hnojiv.
Kontaktní dermatitida na nikl se může vyskytovat např. po kontaktu s oděvní bižuterií (cvočky, nýty knoflíky, přívěsky, zdrhovadla, spony, přezky, aj.), s klenoty a bižuteriií (náušnice, řetízky, náramky,

Informace pro pacienta www.epitesty.cz

SÍRAN NIKELNATÝ

Synonyma a jiné názvy:
Nikl sulfát, Nickel sulfate, Niccolum sulfuricum, Niccoli sulfas

Přecitlivělost na nikl je nejčastější příčinou vzniku alergické kontaktní dermatitidy (ACD) na celém světě. Ionty niklu jsou dnes kvůli zušlechťování kovů, defacto ve všech kovech, včetně kovů vzácných. Nikl se používá k povrchové úpravě mnoha předmětů denního použití. Nikl se využívá v elektroprůmyslu (v galvanovnách, akumulátory, baterie). Soli niklu se používají jako přísady do bělicích činidel (např. prací prostředky), do barev a glazur a při výrobě minerálních olejů, cementu či chemických hnojiv.
Kontaktní dermatitida na nikl se může vyskytovat např. po kontaktu s oděvní bižuterií (cvočky, nýty knoflíky, přívěsky, zdrhovadla, spony, přezky, aj.), s klenoty a bižuteriií (náušnice, řetízky, náramky,

prstýnky, hodinky), s různými nástroji (příbory, nože, nůžky, kleště, pinzety) a dalšími kovovými předměty (sponky, brýle , klíče, natáčky, mince, deštníky, nábytková kování, kliky, vodovodní kohoutky). Totéž i po styku kůže s předměty ze stříbra, alpaky a bílého zlata právě kvůli znečištění niklem.
Předměty lze někdy nahradit jinými materiály např. z plastických hmot nebo je opatřit ochranným lakem, návlekem či nechat předmět postříbřit.
Sdružená přecitlivělost je možná s kobaltem, paladiem nebo chromem. Sloučeniny niklu mohou vyvolat i kožní onemocnění Erythema multiforme like erupci, respektive tzv. airborn contact allergy.
Spolehlivou praktickou pomůckou k testování přítomnosti niklu je přípravek **Chemo Nickel test**, který umožní pacientovi identifikovat předměty denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty niklu, a vyhnout se tak kontaktu s niklem, a tím zamezit vzniku kontaktní dermatitidy niklem vyvolávané.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

prstýnky, hodinky), s různými nástroji (příbory, nože, nůžky, kleště, pinzety) a dalšími kovovými předměty (sponky, brýle , klíče, natáčky, mince, deštníky, nábytková kování, kliky, vodovodní kohoutky). Totéž i po styku kůže s předměty ze stříbra, alpaky a bílého zlata právě kvůli znečištění niklem.
Předměty lze někdy nahradit jinými materiály např. z plastických hmot nebo je opatřit ochranným lakem, návlekem či nechat předmět postříbřit.
Sdružená přecitlivělost je možná s kobaltem, paladiem nebo chromem. Sloučeniny niklu mohou vyvolat i kožní onemocnění Erythema multiforme like erupci, respektive tzv. airborn contact allergy.
Spolehlivou praktickou pomůckou k testování přítomnosti niklu je přípravek **Chemo Nickel test**, který umožní pacientovi identifikovat předměty denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty niklu, a vyhnout se tak kontaktu s niklem, a tím zamezit vzniku kontaktní dermatitidy niklem vyvolávané.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

prstýnky, hodinky), s různými nástroji (příbory, nože, nůžky, kleště, pinzety) a dalšími kovovými předměty (sponky, brýle , klíče, natáčky, mince, deštníky, nábytková kování, kliky, vodovodní kohoutky). Totéž i po styku kůže s předměty ze stříbra, alpaky a bílého zlata právě kvůli znečištění niklem.
Předměty lze někdy nahradit jinými materiály např. z plastických hmot nebo je opatřit ochranným lakem, návlekem či nechat předmět postříbřit.
Sdružená přecitlivělost je možná s kobaltem, paladiem nebo chromem. Sloučeniny niklu mohou vyvolat i kožní onemocnění Erythema multiforme like erupci, respektive tzv. airborn contact allergy.
Spolehlivou praktickou pomůckou k testování přítomnosti niklu je přípravek **Chemo Nickel test**, který umožní pacientovi identifikovat předměty denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty niklu, a vyhnout se tak kontaktu s niklem, a tím zamezit vzniku kontaktní dermatitidy niklem vyvolávané.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

prstýnky, hodinky), s různými nástroji (příbory, nože, nůžky, kleště, pinzety) a dalšími kovovými předměty (sponky, brýle , klíče, natáčky, mince, deštníky, nábytková kování, kliky, vodovodní kohoutky). Totéž i po styku kůže s předměty ze stříbra, alpaky a bílého zlata právě kvůli znečištění niklem.
Předměty lze někdy nahradit jinými materiály např. z plastických hmot nebo je opatřit ochranným lakem, návlekem či nechat předmět postříbřit.
Sdružená přecitlivělost je možná s kobaltem, paladiem nebo chromem. Sloučeniny niklu mohou vyvolat i kožní onemocnění Erythema multiforme like erupci, respektive tzv. airborn contact allergy.
Spolehlivou praktickou pomůckou k testování přítomnosti niklu je přípravek **Chemo Nickel test**, který umožní pacientovi identifikovat předměty denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty niklu, a vyhnout se tak kontaktu s niklem, a tím zamezit vzniku kontaktní dermatitidy niklem vyvolávané.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

prstýnky, hodinky), s různými nástroji (příbory, nože, nůžky, kleště, pinzety) a dalšími kovovými předměty (sponky, brýle , klíče, natáčky, mince, deštníky, nábytková kování, kliky, vodovodní kohoutky). Totéž i po styku kůže s předměty ze stříbra, alpaky a bílého zlata právě kvůli znečištění niklem.
Předměty lze někdy nahradit jinými materiály např. z plastických hmot nebo je opatřit ochranným lakem, návlekem či nechat předmět postříbřit.
Sdružená přecitlivělost je možná s kobaltem, paladiem nebo chromem. Sloučeniny niklu mohou vyvolat i kožní onemocnění Erythema multiforme like erupci, respektive tzv. airborn contact allergy.
Spolehlivou praktickou pomůckou k testování přítomnosti niklu je přípravek **Chemo Nickel test**, který umožní pacientovi identifikovat předměty denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty niklu, a vyhnout se tak kontaktu s niklem, a tím zamezit vzniku kontaktní dermatitidy niklem vyvolávané.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

prstýnky, hodinky), s různými nástroji (příbory, nože, nůžky, kleště, pinzety) a dalšími kovovými předměty (sponky, brýle , klíče, natáčky, mince, deštníky, nábytková kování, kliky, vodovodní kohoutky). Totéž i po styku kůže s předměty ze stříbra, alpaky a bílého zlata právě kvůli znečištění niklem.
Předměty lze někdy nahradit jinými materiály např. z plastických hmot nebo je opatřit ochranným lakem, návlekem či nechat předmět postříbřit.
Sdružená přecitlivělost je možná s kobaltem, paladiem nebo chromem. Sloučeniny niklu mohou vyvolat i kožní onemocnění Erythema multiforme like erupci, respektive tzv. airborn contact allergy.
Spolehlivou praktickou pomůckou k testování přítomnosti niklu je přípravek **Chemo Nickel test**, který umožní pacientovi identifikovat předměty denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty niklu, a vyhnout se tak kontaktu s niklem, a tím zamezit vzniku kontaktní dermatitidy niklem vyvolávané.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

prstýnky, hodinky), s různými nástroji (příbory, nože, nůžky, kleště, pinzety) a dalšími kovovými předměty (sponky, brýle , klíče, natáčky, mince, deštníky, nábytková kování, kliky, vodovodní kohoutky). Totéž i po styku kůže s předměty ze stříbra, alpaky a bílého zlata právě kvůli znečištění niklem.
Předměty lze někdy nahradit jinými materiály např. z plastických hmot nebo je opatřit ochranným lakem, návlekem či nechat předmět postříbřit.
Sdružená přecitlivělost je možná s kobaltem, paladiem nebo chromem. Sloučeniny niklu mohou vyvolat i kožní onemocnění Erythema multiforme like erupci, respektive tzv. airborn contact allergy.
Spolehlivou praktickou pomůckou k testování přítomnosti niklu je přípravek **Chemo Nickel test**, který umožní pacientovi identifikovat předměty denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty niklu, a vyhnout se tak kontaktu s niklem, a tím zamezit vzniku kontaktní dermatitidy niklem vyvolávané.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

prstýnky, hodinky), s různými nástroji (příbory, nože, nůžky, kleště, pinzety) a dalšími kovovými předměty (sponky, brýle , klíče, natáčky, mince, deštníky, nábytková kování, kliky, vodovodní kohoutky). Totéž i po styku kůže s předměty ze stříbra, alpaky a bílého zlata právě kvůli znečištění niklem.
Předměty lze někdy nahradit jinými materiály např. z plastických hmot nebo je opatřit ochranným lakem, návlekem či nechat předmět postříbřit.
Sdružená přecitlivělost je možná s kobaltem, paladiem nebo chromem. Sloučeniny niklu mohou vyvolat i kožní onemocnění Erythema multiforme like erupci, respektive tzv. airborn contact allergy.
Spolehlivou praktickou pomůckou k testování přítomnosti niklu je přípravek **Chemo Nickel test**, který umožní pacientovi identifikovat předměty denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty niklu, a vyhnout se tak kontaktu s niklem, a tím zamezit vzniku kontaktní dermatitidy niklem vyvolávané.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB